

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE INTENSITATII TRATAMENTULUI

CAPITOLUL 5

Academia de estetica

2007

AVANTAJELE SI DEZAVANTAJELE INTENSITATII TRATAMENTULUI

În general, gradul de strângere (micșorare al pielii) obținut are legătură cu intensitatea tratamentului de strângere a pielii, folosind arcul electric.

Intensitatea mai ridicată a tratamentului:

- Rezultatele privind strângerea pleoapei sunt mai bune pe măsură ce zona s-a vindecat. Astfel, vor fi necesare mai puține tratamente pentru a obține rezultatele dorite.
- Inflamațiile și bășicile vor fi mai multe după tratament
- Va dura mai mult reducerea inflamațiilor și a bășicilor
- Timpul de așteptare va fi mai mare
- Este mai puțin probabil să aveți efecte nedorite

Dacă tratamentul va avea o intensitate mai scăzută:

- Rezultatele de strângere a pleoapelor vor fi mai mici. Pleoapele se vor strânge mai puțin.
- Inflamațiile și bășicile vor fi mai mici după tratament
- Nivelurile de disconfort vor fi mai mici după tratament
- Va dura mai puțin reducerea inflamațiilor și a bășicilor
- Timpul de așteptare va fi mai mic
- Este mai puțin probabil să aveți efecte nedorite

Vă rugăm să nu fiți tentat să faceți tratamente la intensități ridicate, pentru a obține rezultate dramatice într-o singură sesiune. În majoritatea cazurilor, dacă faceți acest lucru, nu obțineți rezultate dramatice, care sunt posibile numai cu ajutorul chirurgiei.

Contrație imediată aparentă a pielii pe durata strângerii pleoapei.

Efectul ce poate fi imediat observat al strângerii pleoapei, este contracția aparentă a pielii. Vă rugăm să luați în considerare faptul că acest lucru nu este un lucru permanent și reprezentativ pentru rezultatele finale ale sesiunii, pe care le desfășurați.

Rezultatele vor deveni aparente numai după ce zona s-a vindecat complet, după ce inflamația s-a redus complet, iar crustele au căzut, iar procesul de peeling este terminat. Această contracție aparentă imediată a pielii poate rezulta în riduri fine , care vor dispărea complet în mod aparent, dar totuși nu reprezintă un efect permanent, deoarece se datorează pur și simplu efectelor superficiale de deshidratare ale arcului electric.

Imflamare și timp de așteptare

Imflamarea este caracteristică strângerii pleoapei prin folosirea plasmei electrice (sau laserului) și trebuie întotdeauna să ne așteptăm la așa ceva după acest tip de procedură estetică. Umflarea poate fi redusă prin folosirea unor anumite tehnici, însă nu poate fi niciodată evitată, deoarece, pentru a produce strângerea localizată dorită, este necesară o ardere deliberată controlată a pleoapelor.

Vă rugăm să luați în considerare faptul că umflarea nu trebuie tratată, deoarece nu este o boală și este o consecință directă a arsurii controlate, provocată de tratamentul estetic. O greșeală obișnuită după tratamentul de îngrijire, este utilizarea antihistaminicelor pentru a încerca să reduceți umflarea. În orice caz, acest tip de umflare nu răspunde la antihistaminice. Din acest motiv, nu trebuie să luați antihistaminice.

Inflamarea în ziua următoare și atinge nivelul maxim a doua zi. În ziua a treia sau a patra după tratament, umflarea începe de obicei să se reducă ușor, iar în majoritatea cazurilor umflarea se va retrage complet în ziua a cincea. Atunci când umflarea începe să se reducă, încep să se formeze crustele. Vă rugăm să luați în considerare faptul că crustele nu e formează în majoritatea cazurilor. În mod normal, crustele cad singure în ziua a șasea sau a șaptea după tratament. Intensitatea inflamației și nivelurile de disconfort nu depind numai de intensitatea tratamentului, ci și de reacția pielii la nivel individual.

În cazul tratamentelor cu intensitate ridicată, pot apare și bășici. Fluidul din bășică se poate transfera de asemenea pleoapelor inferioare (pungilor sub ochi). Uneori, pleoapa cu bășică poate elibera ceva fluide pe durata recuperării. Din acest motiv, îngrijirea post-tratament este foarte importantă și trebuie să se concentreze pe evitarea unor posibile cauze de infecție. Acest lucru are loc pur și simplu prin păstrarea zonei curate, evitarea unor posibile cauze de infecții și aplicarea unui antiseptic potrivit, de două ori pe zi. Încă o dată, inflamațiile reprezintă o reacție normală la care ne putem aștepta după tratamentul cu intensitate ridicată și începe în mod normal să se reducă la trei sau patru zile după tratament.



Cand trebuie repetat tratamentul?

Efectele pe termen lung al strângerii pleoapei, prin utilizarea fibroblast este o strângere pe termen lung al pleoapei. Acesta îmbunătățește aspectul pleoapelor căzute. Efectele de strângere a pielii sunt cumulative , deci repetarea tratamentului duce la rezultate foarte bune pe termen lung.

Tratamentul poate fi repetat deseori după 8 săptămâni dacă nu s-au raportat efecte adverse și s-au desfășurat numai tratamentul cu intensitate scăzută/medie. Diverși oameni au reacții diferite ale pielii la tratament, iar cosmeticianul trebuie să se asigure că zona a fost acoperită în întregime. Dacă totuși zona este foarte sensibilă la atingere, înseamnă că zona tratată încă se află în proces de recuperare sau regenerare. Odată ce recuperarea este finalizată, pielea se va simți din nou normal.

INLATURAREA SIRINGOAMELOR

Siringoamele sunt creșteri benigne inofensive, găsite în general grupate pe pleoape, deși se pot găsi și la subsuori, ombilic și în alte părți ale corpului.

Este important să evidențiați faptul că Siringoamele sunt leziuni benigne și nu reprezintă nici un pericol asupra sănătății. Astfel, acestea pot fi lăsate netratate și pot fi înlăturate numai din motive cosmetice. Siringoamele au diverse forme și culori, pot fi ovale, sub formă de dom, sau rotunde. Dimensiunea poate varia de la Siringom la siringom.

Siringoamele preorbitale pot fi grupate în mod inegal într-un singur loc, sau distribuite la fel de bine pe zona pielii din jurul ochilor, sau pleoapelor.

Siringoamele preorbitale sunt umflături rotunde de culoarea pielii sau gălbui, cu diametru între 1-3mm.

Pulverizați pentru a nivela Siringomul cu restul pielii după cum se arată în filmul de mai sus. Țineți minte să ștergeți reziduurile de carbon din când în când, preferabil după operațiunea de pulverizare.



START

Academia de estetica

2007

STRANGEREA PLEOAPELOR

Fibroblast poate fi folosit pentru strângerea pielii din jurul ochilor, ceea ce rezultă în atenuarea ridurilor pre-orbitale, ceea ce poate fi realizat în aceeași sesiune cu strângerea pleoapelor, dacă este nevoie. Este important să evitați reaplicarea arcului pe zona deja tratată. Numai dacă zona s-a recuperat în mod adecvat (în general după 4-6 săptămâni).

În plus, deși în multe cazuri este posibilă atingerea rezultatelor dorite în decursul câtorva sesiuni (de la 2 până la 3), este de preferat împărțirea tratamentului în mai multe sesiuni (între 3-5). Asta deoarece prelungirea tratamentului permite specialistului în estetică să aibă mai mult control asupra rezultatului procedurii. Acest lucru are loc prin varierea intensității tratamentului. De asemenea, pe durata vindecării pielii, unele zone se pot strânge mai mult decât altele, deci vă sfătuim să faceți cel puțin două sesiuni la fiecare client, chiar și în cazurile în care rezultatele dorite pot fi obținute numai în cadrul unei sesiuni.

De obicei, pe durata primei sesiuni, specialistul în estetică cu experiență, va acoperi în mod normal o zonă mare a pleoapei superioare, pentru a obține cele mai bune rezultate posibile.

Sesiunile ulterioare pot fi utilizate pentru a armoniza și corecta orice imperfecțiuni sau neuniformități lăsate după prima sau ultima sesiune.

Acasă, clientul ar trebui să se spele și să clătească pe față ca de obicei, să se usuce cu un prosop din bumbac, tapotând cu atenție și fără să frece zona tratată. Nu trebuie folosit machiaj sau alte creme. Înainte ca zona tratată cu dispozitivul cu plasmă să se fi recuperat complet. Pe durata fiecărei sesiuni, cosmeticiana trebuie să ia întotdeauna măsuri de precauție pentru a reduce orice mișcări bruște, neașteptate ale clientului.