

REACTII ADVERSE

CAPITOLUL 5

Academia de estetica

2007

REACTII ADVERSE

Reacțiile adverse potențiale:

1. Hiperpigmentare. Acest lucru se datorează numai expunerii zonei la radiațiile UV, pe durata procesului îndelungat de vindecare sau reacția la vindecarea unui client. Acest lucru nu se datorează niciodată tipului de dispozitiv utilizat, sau modului în care a fost desfășurat tratamentul
2. Pete Roz Atrofice (unde au fost aplicate punctele), care durează timp de 6 luni după tratament. Nu este încă foarte clar ce provoacă această reacție adversă pe termen lung, în să până acum s-a retras de la sine pe termen lung. Se crede că se datorează utilizării machiajului sau produselor nepotrivite pe durata procesului nevindecare pe termen scurt.
3. Procesul de vindecare pe termen lung, împreună cu inflamarea zonei. Acest efect advers a fost raportat numai după tratamentele cu intensitate ridicată. De asemenea, tot din acest motiv, se recomandă tratamentele cu intensitate redusă sau medie.

4. Perioadele îndelungate de laxitate a pielii pe pleoapele superioare unde au fost desfășurate tratamente de intensitate ridicată. Laxitatea este de asemenea asociată cu un sentiment de ușor disconfort pe zona tratată. Acest efect advers a fost raportat după tratamentele cu toate dispozitivele, în special după tratamentele cu intensitate ridicată.
 5. Istoricul poate include infestare, reacții alergice, accidente mecanice (leziuni acneice), sau reacții la medicamente, erupții fototoxice, vânățai și boli inflamatorii ale pielii, din familia eczemei/dermatitei. Acest tip de pigmentare poate închide pielea prin expunere la razele UV, iar prin utilizarea diverselor produse chimice și medicamente, cum ar fi tetraciclina, bleomicina, doxorubicina, 5-fluorouracil, busulfan, arsenic, argint, aur, medicamente pentru tratarea malariei, hormoni și clofazimină.
- **Perioada de așteptare** între tratamente. Clientul poate începe orice activitate profesională imediat după acest tratament estetic, dar în orice caz, clientul ar trebui să evite orice activități care pot crește expunerea la potențiale infecții. Ar putea apare inflamații asociate cu acest tratament. În orice caz, inflamarea este un eveniment rar și are loc de obicei după tratamentele cu intensitate ridicată și începe în ziua după atingerea punctului culminant al tratamentului, în a treia sau a patra zi și se reduce de la sine. *Timpul de așteptare* mediu este de 7 zile și variază în funcție de intensitatea tratamentului și reacția pielii fiecărei persoane

- Tratamentele pot fi repetate o dată la fiecare 4-5 săptămâni. În funcție de reacția pielii la tratament (pielea va deveni mai roz după 4-6 săptămâni), așteptați până ce culoarea pielii devine normală, înainte de a repeta tratamentul
- În mod normal, pentru ridurile *periorale* (ridurile de fumător), pot fi necesare 4-5 tratamente cu intensitate medie, pentru a obține rezultate satisfăcătoare.
- În cazul ridurilor *periorale* la nefumători, pot fi suficiente una sau două tratamente de intensitate medie, pentru a obține rezultatele dorite.